

**DE EPISTAXI  
DISSERTATIO  
INAUGURALIS  
QUAM ... MENSE  
MARTII ANNO...**

---

Pietro Bosisio



DE  
**EPISTAXI**

*Dissertatio Inauguralis*

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE PRAELECTISSIMI DOMINI  
DIRECTORIS, AC PRAESIDENTIS FACULTATIS MEDICAE  
SPECTABILIS DOMINI DECANI DEC. NOT. CLARISSIMOQUE  
D. D. PROFESSORIS PRAEDICTORUM MEDICINAE LIBERA  
ARTE CONSEQUENTIA ET ATTENTIONE AC CELEBRATA  
UNIVERSITATE TUCIENSIS

ADPROMPT

**DOCT. CAMILLO PLATNER**

PHYSIC. LEGAL. ET POLIT. MED. PROF. ORAT.

UNA CUM THESIS DEFENDENDIS

MDCCCXLIII MDCCCXLI

PUBLICAE DISQUISITIONI OFFERUNT

**BOISIO PETRUS**

SPINOLANENSIS.



**TUCI 1843**

EX TYPOGRAPHIA SUM ET SOCI.

*Platner*

111

NEO DILECTISSIMO

**PAGE**

NEO PRINCE TENE SPIS

AMORIS ET GRATITUDINIS

GAUSS

B. D. D.





## DE EPISTAXI.

*Epistaxis* vocatur ( a græcis vocibus *epi* et *staxis* lente, guttulin fluxu ) apud consue-  
tos salubrior sanguinis e membranis mucipen-  
tas harum cavas abscissantis vasis proli-  
fantis evasatio.

Ad hoc frequens oritur hujusmodi proflu-  
vium, a proclariissimo Alberti Hemorrhoidalis  
nomine insignitum, in *Lexico universali An-  
atomico* usurpatum, observare contingit, et  
veteriorum medicorum scriptores de ipso dum  
loquebantur uni Hemorrhagiae vocem uteren-  
tur. Hemorrhagia tamen juxta illos coarctat  
quiescentisque sanguis ingens vi et copia e  
naribus effluit, dum e coarctata si lente et  
pauci quantitate exit, tumore medullæ Pa-  
rentis preesente juveni habetur, et *stasis* vocatur  
si guttulin profluat.

Quocumque autem angulis jactare obli-  
 tiocet, in praei frequentissima videtur etiam  
 aliqui subiecti, in quo manifestatur, ullo de-  
 trimento locum habere, et inferabilis aere in-  
 noxia, juxta Nosterum, est. Quia imo, di-  
 versa admodum sub circumstantiis magis cum  
 rigorum emolumento fieri potest, et hunc me-  
 rito critica aere salutaria vocetur. Reliqua ad  
 quam hic locorum silentio praetermittenda nau-  
 tiquea est maxime medicum interesse tam op-  
 portuno tempore non modo dignoscere, ve-  
 rare etiam praedicere, quemadmodum fegit Ga-  
 lenus, cui hujusmodi sectionem nequam romam  
 adeptus est. Calaberrimus resque hic medicum  
 ad juvenem accersitas fuerit, qui quarto anni  
 morbi die violente adeo delirio corripidulter,  
 et lectum continuo deserere nitentur, et ru-  
 brum veluti serpentem indolenter prae occu-  
 lū haberet. Qui propriam agrote opem fere-  
 bant medici, de vanatione morante non  
 voce clarescent; obstitit e contra Galenus, qui  
 non modo proximum apitaxia praefatus est,  
 verum, quodam rubore a dextero uni latere  
 ad ipsam usque exteras, peripasto, per dex-  
 teram manum coarctatorem fore praestantem.  
 Quod paulo post evenit. Sed narium haemor-  
 rhagia locum quoque habere potest cum angli

demum, quemadmodum in pluribus morborum affectionibus accidit, et tunc acutior, sive insularis; juxta Sauvagesium, vel morborum acuta Sanguinis, qui effunditur, quantitate perperam, magis vel excedens et vehementer, aut parca, Nescienti ad mentem, esse quærit. *Melancholicam* epistaxim in quodam paulo observavit Fied, admittuntque alii, qui plus minus frequenter recurrere tradunt, modo statatis periodicis, periodica, modo ad intervalla admodum irregularia *inter*, anomala. Adnotandum tamen est periodicæ hæmorrhagiæ casus in dubium revocare clarissimum Boerhaav, qui pariter contendit utram *epidemicam* epistaxim exempla resque observata lauriant, nondum statutum esse. Prestantissimus Sauvagesius quæ in morbis chronicis occurrunt, ab illa quæ scotos committit, distinguendum esse præcipit; hæc autem divisio inutilis prorsus creditur quæ epistaxim per se aeternam semper affectionem existit. Majorem e contrario respectum meretur alia epistaxim divisio ab ipso Sauvagesio, Fied, aliisque posita, juxta quam in acutam et passivam scinditur, quarum prima in morbis acutis et subjectis phthorici-spleneticis, phthorice etiam dicitur, altera aplyctia coæcteticis in morbis chronicis, et præsertim in scorbutico



est communis. Denique alia quoque haemorrhagiae casale species hic commemoranda venit, illa nimirum quae hereditatis privilegio a patribus ad nepotes transfunditur, haemorrhoidalis, cujus exempla apud medicos scriptores minime de-  
videretur.

### ΕΠΙΣΤΑΞΙΣ ΕΠΙΟΤΕΤΡΟΙΣ.

Sanguis per nares exipit, cui violentiae testis admodum effectum consistit, quando in subjectis haemorrhoidibus contingat, pluribus ut plurimum symptomatibus praeceditur, quae omnia imperum actionem magnamque adhaerent caput verum deorsum. Hinc sanguines colli vasa quatuordecim distendantur, eo turgent, vehementius frequentiusque micant arteriae carotides, nec non temporales, color capitis eo magis intruditur, et podex in ipso sensu praesens est. Dolor praeterea hanc regionem plus minus exoritur, sanguis graviter, haud raro pulsans, interdum haesitans, diversaque occupat partes, sed praecipue frontem, tempora, utriusque radicem. Habet praeterea totaeque facies, gena praecipue non tantum, illaeque lateri cujus per narem sanguis effuso consecuturum erit; educatione enim oportet per-

rare ab utroque naribus hæmorrhagiam obtinere. Hinc addo quod convalescenti admodum sunt sanguinem per hanc partem missuri, qui aliquam stuporem et torporis speciem experiantur. Bene interea tranquillique somno frui prohibentur a tædiis, quibus turbantur imaginibus, a terribili lætitudine, quæ horrenda ipsius affert spectra, visiones, lacrimas, sanguinis effusiones, et generatim, Galeno et Nestore docentibus, objecta sanguine aut rubra colore tincta; juvenisque, quem supra memoravi, serpentem rubrum cernere autemabatur. Squæres poro variam et tinnitibus inaurit, et quidam ephoricos gradus advertitur. Tunc stuporem obseditur, inopentique vertigine tentatur; oculi rubent, quasi levisi detineantur phlegmâ, lacrymas ludent in latere potissimum in quo sanguis erupturus erit. Pleuritidis et tussis sensus in naribus abortitur, quæ siccæ et aridæ cernuntur, calent, atque pruritum et distillationem quandam patiuntur; quæ quidem cuncta phoronomia in ea preprimis nunc advertantur, per quæ hæmorrhagia obtinebit. Frigori interim extrema, virium magnam dedolationem experiantur patientes, atque diversis spasmodicis affectibus tunc hypochondria verius, tunc ad extremitates per-

sim tentantur. Nec desunt interdum abdominales dolores plus minus intensi, neque ad recedendum sive et ipse vomitus, neque sub acutibus sanguinis nonnunquam effluis succedit. Urinae parcae et terrens excrementis, pulvis pleni percipiuntur, frequentes, et fortes, expandi tunc, et undati, atque saepe saepe diroti et quidem copiosiores, in altera praesertim brachia, lateri ex quo haemorrhagia provenit, respondent.

At postquam haec omnia mox memorata phaenomena per plus minus longum temporis intervallum perduraverint, si sanguis aut larga quantitate, pressu cuius eget, cessat, acutim utrinque evanescant, et ubi epistaxis in morbo contigit, in quo quavis sanguinis jectura agrorum detrimento sit, illico sublevarum patiens, pristinaeque valetudinem jam adeptus esse videtur. Sin vero cocti sanguinis quantitas vel modum excedat, vel in morbo locus habet in quibus virus languet, ideoque durescentem ut quodcumque eas angis infringere valet, vel e contrario si minori, quam per sit, copia exeat ipse sanguis, quod oblatribiter circulatorum longe minus erit, quin iam non parvas vias consequatur. Re quidem vera haec perraro testa per nunc affan-

datur sanguis via ut periculum aegrotis par-  
tendatur, nihilominus etiam exempla antiquum  
desiderantur profusioris aut distemperis he-  
morrhagiae, quae vires prostrare valeat, ac  
tristis ceterorum sanguinis profusiorum con-  
secutionem afferat; quemadmodum in homine  
evenit, de quo in *Commentariis Episcopi* bus  
mentio est, qui, in decem dierum spatio,  
quinque et septuaginta, maxime cum detrimen-  
to, sanguinis libram effuderat! Quod si, quan-  
vis parva quantitate, unitatur sanguis in mor-  
borum pathematis maxime cum acribus gra-  
du, vel cum humorum coagulatione comita-  
tis, quocumque ingentes vires praestantur erant,  
cuiuslibet facile videbit. Neque minus de-  
trimenti attendendum est si, natura ipsa, uti  
inquit Boerhaave, salutis consilio suppressa  
per vias ministrant, sanguinis fluxus perdet,  
quam res postulat, obtemperat. Inter eas re-  
tentae vel non est laevae orationis per vias  
effusio collectae, quaedam glandularum diver-  
sa in corporis plagis tametsi a Boerhaave ob-  
servata, non est obvianda, quam idcirco  
ipse auctoris verba hic exponere maluit:  
« lo ho veduto, inquit praedilectissimus Boerhaave  
« (*Annali del sangue*) tra gli altri un gio-  
« vine pabere, sempre disposto all'emorragia

12

« del mare, la quale non muore che incom-  
 « pletamente. Ciascun mare, o circa, l'esse-  
 « nza si estrae ed ora si compietarsi, so-  
 « pravvenia una sensazione ora alle gian-  
 « che del collo, ora alla pelle, alla gola,  
 « alla braccia, e queste sensazioni, ch'erano  
 « delle vere contrazioni hysteriche, rimoveva-  
 « no, di maniera che si poteva calcolare dal  
 « loro numero quello delle emorragie. Questa  
 « gloriosa è morte idropica e perfettamente  
 « tubercolare. »

### ETIOLOGIA.

Quatuordecim reliquarum haemorrhagarum  
 causas, et illas quae epistaxis producendas sunt  
 partes in disponentes sive praedominantes, atque  
 concomitantes sive praesentantes describimus  
 venimus.

Infantilis et juvenilis aetas, robusta corporis  
 complexio, temperamentum sanguineum, in ca-  
 lidioribus regionibus habitatio, in habitum  
 plethoricum dispositio et similia opportunitatem  
 ad epistaxim laesantur. Subiecta porro sunt  
 plebs, laete viridis, opulenta, in qua caput  
 indicare necesse sit, apertis, interioribus me-  
 ditationibus dedita, in ipsam praedilectam adver-

tenent. Qui hereditaria dispositione gaudent facillime in hoc profluvio incident, sicuti illi quæ de more dignas in artem introducere consueverunt. Viscerum praesentium abdominalium obstructions; affectiones syphiliticæ; scorbuticæ, et praesentis naturalium aut hereditarium fluxum venalis, et arguta artificialia vasa- ginalis exulatio in auctis in eodem ordo considerandas veniunt. Rheumatismi et arthriticæ affectionibus; nephritide et ischiuria detrita epistaxis communis adeo esse solet; ut magis Hippocrates hoc præceptum reliquerit, in scilicet, «venarum, rheumatis aut ischiuride laborantibus in juvenili ætate epistaxis faciat subjecti utroque inquietandum esse. Neque enim rixorem tibi videantur aptum ad dispositionem in illud nascendum: vicissitudines atmosphericas, sæpius tempestates, quæ inter ver et ætatem venarum primo erigendi videntur; quod jam doctissimi celeberrimus Fridericus Hoffmannus, tradens: » Per observationem eam » in conspecto; est plura vere posuimus et » autumno et circa æquinoctia in præteritione » aliam ætate in ætatem liquorem stillicidiam (Medic. system. vol. I. IV p. II p. 6).

Prostatitica autem epistaxis casus memorantes, liquorem fronti et naso illatorum,

*Bonino*

122

neq. nec membranas pituitarias punctionem  
 et vulnere mentionem prae prius habebi-  
 mus. Causae deinde, et contusiones ex ipsis  
 procedentes, cerebri commotiones, crassii fr-  
 acturae aliisque id genus sanguinis per aures  
 evacuationem comitari habere possunt. Nunc  
 porro ad tremores, vomitus, tussis, sterna-  
 tusus, claudus, vociferatio, manduca aliquando  
 effectum pignere queunt. Sub oculis feride ab-  
 rubelationes, commotio in oculis oculis ca-  
 lida, halcorum calidorum tunc, aut sanguis  
 per aures eruit, Nictus moventis, in oculis  
 quodque sunt. Quibus, [tunc] eadem auctori-  
 tas praecipiam, compressio super [supra] rursus  
 per aures collata, aut, J. P. Frank prae-  
 cipiam, per stratus exercitatus, addenda est.  
 Neque minorem profecto symbolum conferant  
 vehementes animi commotiones, substantiarum  
 scilicet et irascibilium (sternutatoris puta) per  
 aures attractio, et amara, et oculis oculis  
 oculis; et fracturae, et insecta vermesque in  
 variis cavis nidulantes. Denique polyporum  
 varium crubio, commotio electrica, et gra-  
 dioris membri mutilatio aut expulsiua, Hoff-  
 manno prae aliis docente, in eadem classe  
 comprehendatur.

# PROGNOSES.

Multiplicis circumstantiis epistaxis prognosim multimoda variare queat.

Jam superius intussum, variis hæmorrhagiam aliquando supervenire magis cum agrosam complementis, sanctaque morbosæ phænomena cito, ipsa apparentia, nonnunquam evadentes. Hæc in febribus, sic dictis, acutis in morbis ab universali plethora, sive a capitis congestione procedentibus, in morbis quibusdam exanthematicis, variolis, morbillis, scarlatinâ, leucæ puerilis habere consuevit, in quibus, critice tempore evadit. Hinc enim in quibus largius a morbis sanguine profusione hæc generatur animus est, quippe quod morbum ex integro solvit, aut saltem militem reddat. Hujusmodi ab epistaxi effectum attendere sequens præceptum docet in ecotomâ, in vertiginibus, in convulsivis spasmodicisque affectibus, in epilepsia, in variis generis capitis, quibus lenitas afferre solet, licet cum subacuta, vixitenti astutius morbus laudet. Quibus postea, sic sanguine a morbis profusione non omne morbosum cum recte adjuvat celebrantur. Vogelius (De cognoscere, et



cur. princip. corp. hum. affec. t. 1. p. 213 ).  
 Aut prohi dolor ! varium hæmorrhagiæ non  
 semper hæc periculis, et sine exordiente ef-  
 fusu sanguinis capite, sine ob circumstantiarum,  
 sub quibus incidit, diuersitatem, sine ; danti-  
 quæ ob facilitatem qua incidit, non parum  
 interdum nocere possunt. Ubi enim ma-  
 gis vi et copia erumpit sanguis, atque abdo-  
 minales dolores superueniunt ; viresque lan-  
 guere incipiunt, et extrema frigent, atque id  
 genus in conspectum se præbent tunc quidem  
 epistemia præbetur. Nec diuunt erumpit mortis  
 ab ea conuenit, cognoscendi aliter refert  
 Hoffmannus de morbis, quæ plurimæ hæc  
 hæmorrhagiæ passi, fatis denique hæc de  
 causa conuenit. Quod observationibus etiam com-  
 probatur prælaudati Vogeli, qui postquam tra-  
 didit omnia omnia therapeutica inueniunt  
 aliquando in hæc verbum adhiberi : Ne-  
 a que tamen, inquit, per hæc concepta mem-  
 a semper evitari possunt, quæsi volui deliquit  
 a et convalescentes superuenientes præcautiones  
 ( Op. cit. p. 226 ). Ipse porro Vogelius fre-  
 quenter hæc præcautiones repetitorem tamen  
 esse hæc verba præcipit : Quo, fre-  
 a quæ tamen ea repetit, imprimis in vi-  
 a ribi utatur, et periculosis utatur.

(p. 114) Et Hoffmannus testatur a collum  
 & aliam hæmorrhagiam non facile repetere  
 & quam quæ per aures coarctat . . . ; ita ut  
 & elapsa diu aut tantum aliquot horarum spa-  
 & tio sæpe recedant ». (Op. cit. p. 7)  
 Quæ de re ad hæc scriper circumstantiam in  
 epistolas prognosticæ proferenda sæpe atten-  
 dendum erit. Quæ per utrumque aures evenit  
 sanguinis jacturam magis timendum esse quam  
 quæ per unum tantum coarctat, perillaria  
 Gallienus auctor est. In hypochondriacis et  
 hysteriis pulmonibus, non minus quam in  
 hydropis et cæcæis tali omnia est hæmor-  
 rhæcia, quæ, in parva præsertim, infans  
 præfatur si ex opposito merbi locum obtineat,  
 si videlicet, hepate, exempli gratia, adfecto,  
 per laevam aurem locum habeat, si per dex-  
 terem, locus laborante, et sic porro. Qui solen-  
 ter et parvi ætate in epistolas de more of-  
 fendunt, juvenitatem et virilitatem aucti hæ-  
 moptoe et phthisi pulmonali facile laborant.  
 & Nervis hæmorrhægia, (sunt verba præ-  
 stantissimi Barrovi, J. P. Frank sententiam  
 confirmantis) & quibus convulsio supervenit  
 & sæpe apoplexiam præcedit (Lect. Med.  
 pract. t. III. p. 183). In scorbutis et alijsque  
 affectionibus sanguinis & nervis evacuato so-

capa semper continui symptoma, periculique plene creda. In debilibus vitium, maxime praedictissimum Platero, cum sanguine effundit, est, si diutius duret, tuberc, cataracta, glaucoma, et annosiorum producti (Op. Med. p. 269). In bestijs denique praedictum mortem significat.

### THERAPIA.

Si morbus tantum quantitate sanguis a vasis egreditur, atque in subjecto plethorico cum morbo levisime contingit, non modo medicamentibus intendere non erit, sed potius sollicitandos. Alium enim ex parte ex non alio loco crasis effusione maximam utplurimum aegrotantibus ameliorantem emergit, ex altera, si sanguinis profluvium incoercito coarctetur, et benefici naturae coactus turbentur, et morbosarum affectionum solutio retardetur, et ingentes haec raro necesse patruunt. Multa a celeberrimo Vagelio mala ab hac orire, a curis violentis haemorrhagiae suppuratio, emacratio, ophthalmiae, uiriditas, sanguis, odontalgiae diuturnae, otalgiae, oculorumque dolores. Facio encephalae, respirandi difficultas, et cordis palpitatio ab eadem interdum causis procedunt. Neque utpote illis affectus, rempote

apud varicosos desiderantur lacrymationis sanguinæ, phlegmæ, et profusioris phthisiæ. Jo-  
venem memores perillustri Stahl habituli na-  
riæ hæmorrhagiæ subjectum, qui, quotiescun-  
que eas cohibere conabatur, in faciei erysipe-  
lem offendebat, nec non peritidem, angigla-  
rumque tumores, ægidas, illarumque vicorum  
inflammationes petebatur. Tormæ præterea  
ventris, dolores dorsæ et pedes exarcentes,  
rigores in artibus, ejusdem epistaxis suppressio-  
nis consequentes esse contineant, quædam modum  
stium, prælodato Vogelio præcipiente, alvi  
constipatio, hæmorrhoides menses, maculæ  
scarlatinæ, motusque convulsivi. Perillustri  
J. P. Frank epilepticum senem insiduum ex re-  
centi epistaxi obierunt testator, senesque  
grævam dysphagiæ per norem dierum epi-  
stam denotantem, quem hybridum ad neres  
adplicatorem æquum tradit. Quibus cunctis  
pseudoleis Piel vertiginæ, aurium tin-  
itus, variæ sensorum læsiones, dolores ne-  
phríticos, et rheumatismæ sacrum potissimum  
torquentes, adfectiones articulares, oppres-  
sæ, suffocatiæ, emphysemæ, phthisiæque  
additæ mirum curantur.

Hæc itaque cum tali ratione se habeant ab  
intermittitæ sanguinei per neres fluxus suppressi-

etiam commendare non reputari non videtur. Quodsi nihilominus, sive naturae mollioris delicate, sive incerta therapeutiarum auxiliorum administratione, id contingat, sedulo operam naturae accussare est et ipse iterum revocatur. Quem ad suscipiendum scopum optime tradit praecepta jam pluries laudatus Vagelius, cuius ideoque vestigia praecipue sequi non dimentimus proponimus. Nam si epistaxis remediis accensitas oritur, corporis exercitationes validiores etiam primo commendandas veniunt, et deinde potus calidiores et spirituum suppeditandi. Porro erubina, et rosea, millefolium aut menta sylvestris decoctis occifera in nares intrusum maxime cum utilitate accensient. Aqua ipsa tepida in nares frequenter attracta non parum generationis epistalibatur. Quod si haec omnia non sufficiunt, officinalium vaporum pituitarios toxicum obestimationem per penam serrationis locum et fortius intrusum, lectionem peragere oportebit, vel melius, sicuti Aegyptiis mos est, membrana mellea, linculo opte scarificanda erit. (Prælect. secund. l. v. p. 228.)

Aet si cruoris per eam extravasatio limitis sine quantitate excedat, vel in morbois obrepat collectionibus, in quibus vel parcius

sanguinem pectore detrimento esse quæd, hanc  
 quasi studio satagendum erit ac dæmonem  
 profluvium apte ratione citatur, atque zones  
 exinde præstitutas præcaveatur. Quapropter  
 hiæc in casibus animi corporisque quales sint  
 curia negotantibus præcipienda est, erectis  
 corporis partibus commendanda, loculis velan-  
 de, et caput elevatum tenendum. Potus deli-  
 de et aquæ frigidiore confecti, substantiis  
 satietatiodicis et temperatibus confecti, pul-  
 veres sic dicti temperatius vixu absterant  
 locum. Pulvis absorbens Wedelii, nec non  
 elixir acidum Dipeitii, cum tertio ludaci li-  
 quidi Sydenhamii parte a Voglio ad emen-  
 dandæ neque commoedatur. Attemen si hæc  
 non sufficiant, et res se pejus rursu videtur,  
 ac de subjecto robore et plethorice agi-  
 tur, et venæsectio celebranda erit, quæ pro  
 rerum necessitate, repeti poterit, quamvis, si  
 hæmorrhoides minutas multas in causa sint, ex  
 vena cephalica instituere opportunum est. Emol-  
 lentis parte et relaxata climata neque  
 infundenda sunt, atque spiritus advertatur satis  
 afflicto, utrumque frigidum non atque  
 emolumentum apte in calidam aquam pedes ma-  
 nusque immittantur. Quod si nihilominus hæ-  
 morrhagie non cohibentur, spiritus vini in

naris intradenda est, vel radice sympathi pulvis insufflenda, vel, docente Voglio, alumen cum lacte pictarum, aut aquae plantaginis unctio blava et aluminis saccharique saturati drachma injicienda, vel terenda in ovorum albumine intincta, et vitrioli Gemmariorum pulvere inspersione immixtenda. Quibus omnibus, juxta Pinel methodum, et solutionem vitrioli albi, et serum lactis alluminatum, ex lactis ebullientia libris duabus et aluminis crudi drachma confectam addere oportet, sicut etiam, Boerhaave tradente, Linimenta Sinctura catacha imbuta.

Juvant praeterea quae hac usque memoravimus ad caputorem aperturam ostiandam frigidae ad frontem, ad radicem nasi, ad nares superiores, nec non balneola pariter frigida hypochondriis et acroto praepuritis, truncis, internaeque coxae plagae insposita. Juvant extremorum ligaturae, et terror incutus, et naris a qua sanguis effluit, compressio. Juvant epithemata varia, quae inter sequens a Voglio celebratur, compositum, utique, ex aquae verbanae uocis duabus, aceti vini destillati drachma, et vini drachma duabus; aliudque probatissimum esse docet presciterissimus Hellicornus, quod ex acido rosaceo et rutae, citro,

campara, et alio ligni Rhodii conficitur. Juvant apertiones et excoriationes profundius incisae ad os, ad scapulas, ad dorsum, ad auras adnatas, vel etiam hypochondria, juxta Wiertherium, posita; relate ad quas Galeni praecipuum observandum non esse videtur, quod, utroque hypochondrio dextero sicut adplicandae si a dextera parte anguis egreditur et rema vice.

Hae cunctae autem, effectus, qui consequuntur, certitudines, quoviscomque remedia fieri videtur angustia jactura, longe antecellit artificiosa marium obtursio, cautulas, praecipua, celeberrimi Bellonq ope obtenta; quae auxiliante, plures ab orci faucibus, ad quas ingens haemorrhagia propellerat, raptos saltem quotidianis experientia demonstratum est. Quamobrem ita cautula intelli rationem hic locorum verbis praeclearissimi Boyer tradendo opellae formae imponere opportunum duximus coadjuvare. « Qualora al » momento in cui vien chiamato il chirurgo, » la debolezza fosse considerevole tanto da » temere qualunque piccolo ritardo, bisogna » rebbe ricorrere immediatamente » se stesso » più efficace, devvair cioè al temperamento » delle aperture anteriori e posteriori della » fossa nasale da cui ha luogo l'emorragia.



24

« A questo effetto, si introduce nella narice  
 « la sonda inventata da Bellacq, la quale è  
 « composta di una cannula d'argento, legger-  
 « mente curva a una estremità, e recchiodente  
 « in se uno stile egualmente d'argento, che  
 « ad una estremità è guarnito di una molla  
 « di pendolo alla di cui estremità esiste un  
 « bottone d'argento. Arrivata che sia la can-  
 « nula nella faringe, si spinge lo stile, e a  
 « misura che si fa internare, la molla si fa  
 « libera sotto il velo palatino, e penetra nella  
 « bocca, dove facil cosa è il prenderla con  
 « la pinzette a anello, oppure anche colle di-  
 « giti. Si attacca allora alla molla un filo in-  
 « cerato messo a doppio, e ritirando lo stile  
 « e la cannula si conduce questo nella fossa  
 « nasale, facendola quindi sortire dalla nari-  
 « ce... All'estremità del filo, che esce dalla  
 « bocca si attacca un tampone bastantemente  
 « grosso per chiudere esattamente l'apertura  
 « posteriore delle fosse nasali, e tirando dal-  
 « l'indietro all'avanti l'estremità nasale di  
 « questo filo, si conduce il tampone fino a  
 « quest'apertura. Nel tempo che un assistente  
 « tiene questo filo tirandolo in avanti si ricom-  
 « pie la narice con dei tamponi legati, indi si  
 « dividono i due fili, e situati nel loro in-

« intervallo un tampone di fila sul quale si  
 « fermano i fili, facendo due nodi semplici  
 « uno sopra l'altro. Otturando in questa  
 « guisa la narice anteriore e posteriore, non  
 « si impedisce già l'uscita del sangue; ma es-  
 « sendo trattato nella forma casale, si ri-  
 « coagula, e quella compressione che esercita  
 « il grumo sanguigno sui vasi che portano  
 « sangue, arresta l'emorragia. Se il sangue  
 « viene dalle due narici, bisogna tamponare a  
 « destra e a sinistra. In capo a quattro, o  
 « cinque giorni si tolgono i tamponi e si pre-  
 « mette al sangue di uscire coll'iniettare del-  
 « l'acqua tiepida nel naso. L'irritazione oc-  
 « casionata dalla sonda, dalle pinzette, dai  
 « diti introdotti in bocca e in gola, provoca le  
 « stertute e dei costati al volto, e rende  
 « difficile e penosa quest'operazione; ma tanto  
 « meno bisogna ritardarsi, in quanto che tal  
 « metodo di tamponare è l'unico mezzo atto  
 « ad arrestare l'emorragia. Mettendolo in uso  
 « noi abbiamo potuto arrestare diverse volte  
 « l'epistassi, che senza dubbio avrebbe fatto  
 « perire i malati » ( *Tratt. Chir.* t. 3 p. 250 ).

Hic tamen potestimo loco obliuiscendum  
 non est auxilium ad sistendum narium he-  
 morrhagiam a Doctore Negrier propositum,

quod sicut in ceteris, et quo tempore moritur,  
compressio, et subito ejusdem lateris brachio  
elevatione ( *Annali Univ. di Medico*. t. 104.  
p. 613 ); quo praesidio ipse Doctor Angrier  
decessu in casibus apertis cum successo usum  
fuisse testatur.

FINIS

## THESES DEFENDENDÆ.

1. Emesis in revocandis ad vitam asphitica perniciosa.
2. Nimia sensibilitas, uti nimia indifferentia medico nocet.
3. Apoplexiam mares prædiligere.
4. Hæmophthisis tuberculi interdum causa: interdum effectus.
5. Inspiratio ætheris sulfurici innocua, et in chirurgia perutilis.
6. Angina pectoris ad nervoscs adscribenda.

$$d_{\alpha} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta}.$$

$$\text{and } \gamma_1(1, 1) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \\ = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta}.$$

$$\text{and } \beta_1(1, 1) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta} \frac{1}{\alpha + \beta} \\ = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta}.$$

$$\text{and } \gamma_2(1, 1) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta} \frac{1}{\alpha + \beta}.$$

$$\text{and } \beta_2(1, 1) = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta} \frac{1}{\alpha + \beta} \\ = \frac{1}{8} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta}.$$

$$\text{and } \gamma_3(1, 1) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta} \frac{1}{\alpha + \beta} \frac{1}{\alpha + \beta} \\ = \frac{1}{8} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta} \frac{1}{\alpha + \beta}.$$

$$\text{and } \beta_3(1, 1) = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta} \frac{1}{\alpha + \beta} \frac{1}{\alpha + \beta} \\ = \frac{1}{16} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta} \frac{1}{\alpha + \beta}.$$

